

1920 *Lacerta muralis* var. *quadrilineata* BOULENGER, Monogr. Lac. 1, S. 215.

1922 *Lacerta muralis tiliguerta* L. MÜLLER, Naturw. Beobachter. 63, S. 253.

Terra typica: Sardinien.

Verbreitung: Korsika und Sardinien; Monte Cristo, Caprera.

***Lacerta muralis toro* MERTENS.**

1932 *Lacerta muralis toro* MERTENS, Senckenbergiana 14, S. 246, Abb. 5.

Terra typica: Insel Toro, Südwest-Sardinien.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta muralis vinciguerrai* MERTENS.**

1932 *Lacerta muralis vinciguerrai* MERTENS, Senckenbergiana 14, S. 240, Abb. 1.

Terra typica: Insel Gorgona, Ligurisches Meer.

Verbreitung: Die gleiche wie der typische Fundort.

***Lacerta peloponnesiaca* BIBRON & BORY.**

1833 *Lacerta peloponnesiaca* BIBRON & BORY, in BORY, Exp. sci. Morée 3, 1, S. 66, Taf. 10, Fig. 4.

1912 *Lacerta peloponnesiaca* SCHREIBER, Herp. europ. (2), S. 459, Abb. 94.

1920 *Lacerta peloponnesiaca* BOULENGER, Monogr. Lac. 1, S. 159.

Terra typica: Morea.

Verbreitung: Morea, mit Ausnahme des Nordostens.

***Lacerta pityusensis pityusensis* BOSCÁ.**

1883 *Lacerta muralis* var. *pityusensis* BOSCÁ, Anal. Soc. esp. Hist. nat. 12, S. 246.

1912 *Lacerta lilfordi* var. *pityusensis* SCHREIBER, Herp. europ. (2), S. 470.

1920 *Lacerta muralis* var. *pityusensis* BOULENGER, Monogr. Lac. 1, S. 228.

1922 *Lacerta pityusensis pityusensis* MERTENS, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 53, S. 136.

1928 *Lacerta lilfordi pityusensis* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 52.

Terra typica: Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Insel Ibiza, Pityusen, sowie Inseln um Ibiza, soweit sie nicht von ausgesprochenen Rassen der *Lacerta pityusensis* bewohnt sind.

***Lacerta pityusensis affinis* L. MÜLLER.**

1927 *Lacerta lilfordi affinis* L. MÜLLER, Zool. Anz. 73, S. 269.

1928 *Lacerta lilfordi affinis* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 31.

1930 *Lacerta pityusensis affinis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.

Terra typica: Malvin Pequeño, südlich der Isla Ratas, östlich von Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Bemerkungen: Die in der Originalbeschreibung angegebene Terra typica: „Guardia“ erwies sich als falsch. Nachforschungen ergaben, daß die der Beschreibung vorgelegenen Exemplare von der Insel Malvin Pequeño, östlich von Ibiza stammen.

***Lacerta pityusensis algae* WETTSTEIN.**

1937 *Lacerta pityusensis algae* WETTSTEIN, Zool. Anz. 117, S. 295.

Terra typica: Isla Alga (Isla Pouet) nördlich von Formentera, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis calae-saladae* L. MÜLLER.**

1928 *Lacerta lilfordi calae saladae* L. MÜLLER, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 59, S. 387.

1930 *Lacerta pityusensis calae saladae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.

Terra typica: Isla Cala Salada, Westküste von Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis caldesiana* L. MÜLLER.**

1928 *Lacerta lilfordi caldesiana* L. MÜLLER, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 59, S. 387.

1930 *Lacerta pityusensis caldesiana* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 410.

Terra typica: Insel Caldés, Nordküste von Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis canensis EISENTRAUT.

- 1928 *Lacerta lilfordi canensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 14, S. 466.
1930 *Lacerta pityusensis canensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla Caná, an der Ostküste von Ibiza, nördlich der Insel Sta. Eula Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis carl-kochi nom. nov.

- 1927 *Lacerta lilfordi kochi* L. MÜLLER, Zool. Anz. 73, S. 266 (nec: *Lacerta kochii* GISTEL, Blicke in Leben der Natur usw. S. 146, 1868).
1928 *Lacerta lilfordi kochi* MERTENS & MÜLLER, Abh. senk. naturf. Ges. 41, S. 32.
Terra typica: Conejera (Cunillera), westlich von Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Conejera und Del Bosque, westlich von Ibiza, Pityusen.

Lacerta pityusensis espalmadoris L. MÜLLER.

- 1928 *Lacerta lilfordi espalmadoris* L. MÜLLER, Zool. Anz. 78, S. 262.
1930 *Lacerta pityusensis espalmadoris* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Espalmador, südlich von Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis formenterae EISENTRAUT.

- 1928 *Lacerta lilfordi formenterae* EISENTRAUT, Das Aquarium 1928, S. 125.
1930 *Lacerta pityusensis formenterae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Formentera, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis frailensis EISENTRAUT.

- 1928 *Lacerta lilfordi frailensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 14, S. 467.
1930 *Lacerta pityusensis frailensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla del Fraile, dem Westzipfel der Insel Espartó (= Espartá) an der Westküste Ibizas, Pityusen, vorgelagert.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis gastabiensis EISENTRAUT.

- 1928 *Lacerta lilfordi gastabiensis* EISENTRAUT, Das Aquarium 1928 S. 125.
1930 *Lacerta pityusensis gastabiensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla Gastabi, zwischen Ibiza und Formentera, Pityusen.

Verbreitung: Außer Gastabi offenbar auch Isla Negra (Terra typica von *Lacerta lilfordi negrae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 14, S. 468, 1928), Isla Ahorcados (Terra typica von *Lacerta pityusensis ahorcadosi* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 399, 1930) und Isla Espardell (Terra typica von *Lacerta lilfordi esparpellensis* EISENTRAUT, Das Aquarium 1928, S. 125).

Bemerkungen: Über die Rassen *gastabiensis*, *negrae*, *ahorcadosi* und *esparpellensis* können wir uns doch kein abschließendes Urteil bilden, da die Exemplare, die der Ältere von uns von den Inseln Gastabi, Negra, Ahorcados und Espardell erhielt (teils durch Herrn ZENKAMER, teils durch Herrn GRÜN) sich nicht recht mit den Diagnosen EISENTRAUT's decken. Außerdem scheinen die Populationen jeder einzelnen dieser Inseln ziemlich variabel zu sein und machen daher nicht den Eindruck einheitlicher Rassen. Das gleiche ist allerdings auch bei der Nominatform der Fall. Vielleicht wäre es das Beste, alle unausgesprochenen Rassen — vorläufig wenigstens — zu der Nominatform zu stellen. Es liegen dem Älteren von uns noch Eidechsen von 9 kleineren Pityuseninselchen vor, auf deren Beschreibung er wegen ihrer Uneinheitlichkeit und wenig ausgesprochenen Rassendaraktere verzichtete.

Lacerta pityusensis grossae L. MÜLLER.

- 1929 *Lacerta lilfordi grossae* L. MÜLLER, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 40, S. 296.
1930 *Lacerta pityusensis grossae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.

Terra typica: Isla Grossa (St. Eulalia), östlich von Ibiza, Pityusen
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis grueni* L. MÜLLER.**

- 1928 *Lacerta lilfordi grueni* L. MÜLLER, Zool. Anz. 78, S. 270.
1930 *Lacerta pityusensis grueni* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla dos Trocados, bei Espalmador, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis hedwig-kameriae* L. MÜLLER.**

- 1927 *Lacerta lilfordi hedwig-kameriae* L. MÜLLER, Zool. Anz. 74, S. 185.
1928 *Lacerta lilfordi hedwig-kameriae* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 32.
1930 *Lacerta pityusensis hedwig-kameriae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Margalida (Margarita), nordwestlich von Santa Inés auf Ibiza Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis kameriana* MERTENS.**

- 1927 *Lacerta pityusensis kameriana* MERTENS, Zool. Anz. 69, S. 502.
1928 *Lacerta lilfordi kameriana* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 32.
Terra typica: Insel Espartero (Isla Esparterá), Westküste von Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis maluquerorum* (MERTENS).**

- 1921 *Podarcis pityusensis maluquerorum* MERTENS, Senckenbergiana 3, S. 142.
1922 *Lacerta pityusensis maluquerorum* MERTENS, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 33, S. 136.
1928 *Lacerta lilfordi maluquerorum* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 32.
Terra typica: Isla Bleda Plana (Neplana) bei Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Isla Bleda Plana, Isla Bleda Bosque, Isla Bleda Gorra und Escui de Vermey.

Bemerkung: Dazu als Synonym *Lacerta lilfordi gorrae* EISENTRAUT (Das Aquarium 1928, S. 122).

***Lacerta pityusensis miguelensis* EISENTRAUT.**

- 1928 *Lacerta lilfordi miguelensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 14, S. 467.
1930 *Lacerta pityusensis miguelensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 410.
Terra typica: Isla del Bosque de San Miguel, in der Bucht von San Miguel, Nordküste Ibizas, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis muradae* EISENTRAUT.**

- 1928 *Lacerta lilfordi muradae* EISENTRAUT, Das Aquarium 1928, S. 122.
1930 *Lacerta pityusensis muradae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla Murada, Westküste von Ibiza, nördlich der Isla Margarita, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis ratae* EISENTRAUT.**

- 1928 *Lacerta lilfordi ratae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 14, S. 466.
1930 *Lacerta pityusensis ratae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Isla Ratas, südwestlich vom Hafen von Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

***Lacerta pityusensis redonae* EISENTRAUT.**

- 1928 *Lacerta lilfordi redonae* EISENTRAUT, Das Aquarium 1928, S. 125.
1930 *Lacerta pityusensis redonae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Redona (Redonda) bei St. Eulalia, östlich Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis schreitmüller L. MÜLLER.

- 1927 *Lacerta lilfordi schreitmüller* L. MÜLLER, Zool. Anz. 73, S. 268.
1928 *Lacerta lilfordi schreitmüller* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 33.
1930 *Lacerta pityusensis schreitmüller* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Malvin Grande bei Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica; zum Unterschied von Malvin Peque muß diese östlich von Ibiza gelegene Insel Malvin Grande heißen.

Lacerta pityusensis tagomagensis L. MÜLLER.

- 1927 *Lacerta lilfordi tagomagensis* L. MÜLLER, Zool. Anz. 73, S. 267.
1928 *Lacerta lilfordi tagomagensis* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 33.
1930 *Lacerta pityusensis tagomagensis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Insel Tagomago, östlich von Ibiza, Pityusen.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta pityusensis vedrae L. MÜLLER.

- 1927 *Lacerta lilfordi vedrae* L. MÜLLER, Zool. Anz. 74, S. 190.
1928 *Lacerta lilfordi vedrae* MERTENS & MÜLLER, Abh. senck. naturf. Ges. 41, S. 33.
1930 *Lacerta pityusensis vedrae* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 400.
Terra typica: Insel Vedrà, westlich der Südspitze von Ibiza (bei Cabo Jueu), Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica und Isla Vedranell.

Bemerkungen: Dazu *Lacerta lilfordi vedranellensis* L. MÜLLER, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 39, S. 387, 1929.

Lacerta pityusensis zenonis L. MÜLLER.

- 1929 *Lacerta lilfordi zenonis* L. MÜLLER, Bl. Aquar. Terrar. Kunde 39, S. 388.
1930 *Lacerta pityusensis zenonis* EISENTRAUT, Mitt. zool. Mus. Berlin 16, S. 409.
Terra typica: Escollo von Espartá (Escui de Espartó), Westküste von Ibiza, Pityusen.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta sicula sicula RAFINESQUE.

- 1810 *Lacerta sicula* RAFINESQUE, Caratt. alc. Gen. Anim. S. 8.
1912 *Lacerta serpa* part. SCHREIBER, Herp. europ. (2), S. 444.
1920 *Lacerta muralis* var. *albiventris* part. BOULENGER, Monogr. Lac. 1, S. 199.
1922 *Lacerta sicula sicula* L. MÜLLER, Naturw. Beobachter 63, S. 253.
Terra typica: Sizilien.

Verbreitung: Von der Prov. Rom bis Unteritalien und Ostsizilien, Liparische Inseln.

Lacerta sicula adriatica WERNER.

- 1902 *Lacerta serpa* var. *adriatica* WERNER, Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, S. 386.
1920 *Lacerta muralis* var. *albiventris* part. BOULENGER, Monogr. Lac. 1, S. 199.
1924 *Lacerta sicula adriatica* MERTENS, Pallasia 2, S. 44.
Terra typica: Insel Pelágosa Piccola, Adriatisches Meer.

Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta sicula astorgae MERTENS.

- 1937 *Lacerta sicula astorgae* MERTENS, Zool. Anz. 119, S. 555.
Terra typica: Insel Astorga, Westküste Istriens.
Verbreitung: Die gleiche wie die Terra typica.

Lacerta sicula bagnolensis MERTENS.

- 1937 *Lacerta sicula bagnolensis* MERTENS, Zool. Anz. 119, S. 552.
Terra typica: Insel Bagnole, Westküste Istriens.
Verbreitung: Die gleiche wie der typische Fundort.

Lacerta sicula campestris (BETTA).

- 1857 *Podarcis muralis* var. *campestris* BETTA, Atti Acc. Verona 35, S. 152.
1912 *Lacerta serpa* var. *campestris* SCHREIBER, Herp. europ. (2), S. 450.