

8. - *Ichnotropis chapini* SCHMIDT.

Ichnotropis chapini SCHMIDT, 1919, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., New York, 39, p. 508.

LISTE DES EXEMPLAIRES.

Collection du Musée du Congo (2 exemplaires).

R. G. 3656-57, Adra (Ituri), IV-1925 (SCHOUTEDEN).

LOCALITÉS DÉJÀ CITÉES DU CONGO BELGE.

SCHMIDT (n° 1, 1919, p. 508).

Aba (Ituri) (AMERICAN CONGO EXPEDITION).

WITTE (n° 2, 1933, p. 74).

Adra (SCHOUTEDEN).

9. - *Ichnotropis bivittata* BOCAGE.

Ichnotropis bivittata BOCAGE 1866, Journ. Sc. Lisb., 1, p. 43.

LISTE DES EXEMPLAIRES.

Collection du Musée du Congo belge (3 exemplaires).

R. G. 914 « Bas-Congo », sans date (CABRA).

R. G. 7674, Kansenia (Katanga), 1931 (G. F. DE WITTE).

R. G. 2367, Kandolo (Sankuru), XI-1921 (GHESQUIÈRE).

LOCALITÉ DÉJÀ CITÉE DU CONGO BELGE.

WITTE (n° 2, 1933, p. 74).

Kansenia (G. F. DE WITTE).

10. - *Ichnotropis overlaeti* sp. n.

LISTE DES EXEMPLAIRES.

Collection du Musée du Congo (5 exemplaires).

R. G. 9691 [1 ♂ *Type*], Kapanga (Lulua), 1933 (OVERLAET).

R. G. 40 [1 ♀ *Paratype*], « Kwango », sans autre indication.

R. G. 678 [1 ♂ *Paratype*], Lofoi (Katanga), 1898-1900 (LEMAIRE).

R. G. 1869 [1 ♂ *Paratype*], Luluabourg (Kasai), sans date (R. P. CAMBIER).

R. G. 6045 [1 ♀ *Paratype*], Mukishi (Lomami), 1937 (BECQUET).

LOCALITÉ DÉJÀ CITÉE DU CONGO BELGE.

BOULENGER (n° 1, 1897, p. 277, *Ichnotropis capensis*).

« Kuango » (sans autre indication).

Tête et corps plus ou moins déprimé. Tête $1 \frac{3}{4}$ fois aussi longue que large, sa hauteur étant moindre que la distance entre le bord antérieur de l'œil et le tympan; longueur de la tête un peu plus de 3 fois dans la

longueur du corps jusqu'à l'anus; museau obtusément pointu, aussi long que la partie postoculaire de la tête, canthus rostralis bien distinct, région frénale concave; une concavité de forme lancéolée, bordée de fortes carènes sur la partie supérieure du museau (préfrontales et frontale); sous-oculaire non carénée, ou avec une carène plus ou moins distincte. Cou un peu plus étroit que la tête. Le membre postérieur étant ramené en avant, atteint l'épaule ou entre l'épaule et le tympan chez le mâle, l'aisselle chez la femelle; pied aussi long que la tête; doigts faiblement comprimés. Queue $1 \frac{5}{9}$ fois aussi longue que le corps, tête comprise.

Plaques du dessus de la tête fortement striées et carénées. Narine entre 3 ou 4 plaques; nasales formant une suture derrière la rostrale; frontonasale aussi large que longue; préfrontales plus longues que larges, n'atteignant pas la plus grande sus-oculaire, et formant une suture médiane; frontale aussi longue que la distance qui la sépare de l'extrémité du museau, 2 à 3 fois aussi longue que large, plus étroite dans sa partie postérieure que dans sa partie antérieure; pariétales plus longues que larges, arrondies en arrière; interpariétale aussi grande que les fronto-pariétales, en contact avec une occipitale beaucoup plus courte, dont le bord postérieur est arrondi, et s'étend au-delà des pariétales; 2 grandes sus-oculaires (précédées et suivies d'une ou de plusieurs sus-oculaires), la première plus longue que la distance qui la sépare de la frénale postérieure, dont elle est séparée par une ou plusieurs petites sus-oculaires, la deuxième en contact avec la pariétale; 4 surciliaires, la première la plus longue et formant une suture très oblique avec la deuxième; une série de petites écailles carénées séparant entièrement ou partiellement les sus-oculaires des surciliaires. Nasale inférieure largement en contact avec la rostrale; 1 ou 2 petites postnasales, situées entre les nasales supérieure et inférieure; frénale antérieure plus courte que la deuxième; 4 labiales supérieures situées en avant de la sous-oculaire, qui est plus étroite en dessous qu'au-dessus et borde la bouche. Une temporale antérieure en contact ou séparée de la pariétale par de petites écailles carénées; écailles de la région temporale assez grandes, hexagonales, fortement carénées; plaque tympanique étroite. Paupière inférieure avec au milieu, une série d'écailles plus allongées verticalement; 5 paires de mentonnières, les 3 antérieures en contact au milieu; écailles gulaires imbriquées, se transformant graduellement en plaques ventrales, 16 dans une ligne médiane droite.

Écailles dorsales rhomboidales, lancéolées, fortement carénées, légèrement mucronées, un peu plus petites que les caudales supérieures; plaques ventrales arrondies, plus ou moins hexagonales, un peu plus larges que longues, en 8-9 séries longitudinales et en 23 à 30 séries transversales; 33-38 écailles et plaques autour du milieu du corps. Région préanale

recouverte d'écailles de taille irrégulière. Ecaillage de la partie supérieure des membres antérieurs et postérieurs irrégulière, les plus grandes écailles atteignant la même dimension que les écailles dorsales, lisses ou carénées. 11-12 pores fémoraux de chaque côté. Lamelle subdigitales pluricarénées, spinescentes, 18-21 sous le quatrième orteil. Ecailles caudales fortement carénées, les supérieures semblables aux inférieures, 23-26 dans le 5^e verticille situé après les granules postanaux.

Brun bronzé au-dessus; dos avec 2 séries supéro-latérales plus ou moins irrégulières de petites taches noires présentant plus ou moins l'aspect d'une bande, et parfois aussi une série vertébrale. 2 bandes noires de chaque côté de la tête et du corps, la supérieure commençant à l'extrémité du museau, passant à travers l'œil, la partie supérieure du tympan et s'étendant tout le long du corps, jusqu'à la naissance des membres postérieurs; l'inférieure plus étroite, commençant, plus ou moins distinctement à l'extrémité du museau, traversant le tympan et s'étendant jusqu'à la naissance des membres antérieurs; à partir de cet endroit elle est parfois remplacée par une série de petites taches bleues plus ou moins bordées de noir, s'étendant jusqu'à la naissance des membres postérieurs; des taches bleues sont également présentes à la bande supérieure, entre les membres antérieurs et postérieurs. Une bande blanche commençant au-dessus du tympan, s'étendant plus ou moins distinctement jusqu'à la naissance de la queue et séparant la série supéro-latérale de petites taches noires de la bande noire supérieure; une 2^e bande blanche commençant à l'extrémité du museau, passant à travers le tympan, s'étendant plus ou moins distinctement jusqu'à la naissance de la queue, et séparant la bande noire supérieure de la bande noire inférieure, et de la série de petites taches bleues. Ces dernières sont absentes chez la femelle.

Mensurations en millimètres.

| | R.G. 9891 | R.G. 1369 | R.G. 678 | R.G. 6045 | R.G. 40 |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ♂ Type | ♂ Paratype | ♂ Paratype | ♀ Paratype | ♀ Paratype |
| De l'extrémité du museau jusqu'à l'anus | 56 | 52 | 57 | 56 | 62 |
| De l'extrémité du museau jusqu'au membre antérieur | 22,5 | 28 | 21 | 20 | 22 |
| Longueur de la tête | 14,5 | 13,5 | 15 | 12 | 13 |
| Largeur de la tête | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Hauteur de la tête | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
| Membre antérieur | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 |
| Membre postérieur | 30 | 28 | 33 | 28 | 28 |
| Pied | 14,5 | 13,5 | 15 | 13 | 13 |
| Queue | 97 | 100 | mutilée | 88 | mutilée |

Cette espèce se rapproche surtout d'*Ichnotropis bivittata* BOCAGE et d'*I. capensis* A. SMITH; elle se distingue du premier par la position de la grande sus-oculaire antérieure, séparée de la préfrontale par une ou plusieurs petites sus-oculaires et du deuxième par la dimension de la grande sus-oculaire antérieure, plus longue que la distance qui la sépare de la frénale postérieure.

11. - *Ichnotropis longipes* BOULENGER.

Ichnotropis longipes BOULENGER, 1902, Proc. Zool. Soc. London, 1902, 2, p. 17, pl. III, fig. 2.

LISTE DES EXEMPLAIRES.

Collection du Musée du Congo (41 exemplaires).

R. G. 7777-88, 7799-827, Dilolo (Lualaba), 1-15-IX 1931 (G. F. DE WITTE).

LOCALITÉ DÉJÀ CITÉE DU CONGO BELGE.

WITTE (n° 2, 1933, p. 74).

Dilolo (G. F. DE WITTE).

12. - *Eremias (Lampreremias) nitida quadrinasalis* CHABANAUD.

Eremias quadrinasalis CHABANAUD, 1918, Bull. Mus. Paris, 1918, p. 108.

Eremias nitida garambensis SCHMIDT, 1919, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. New York, 39, p. 511.

Eremias nitida quadrinasalis LOVERIDGE, 1937, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 89, p. 283.

LISTE DES EXEMPLAIRES.

Collection du Musée du Congo (9 exemplaires).

R. G. 3243 (Paratype de *E. nitida garambensis*), Garamba (Uele), V-1912 (LANG & CHAPIN).

R. G. 3359, 3471, 3703, 3776-77 Dika (Uele), III-1925 (SCHOUTEDEN).

R. G. 3481, 3483, 3895, Mauda (Uele), II-1925 (SCHOUTEDEN).

LOCALITÉS DÉJÀ CITÉES DU CONGO BELGE.

SCHMIDT (n° 1, 1919, p. 511, *E. nitida garambensis*).

Garamba, Yakuluku (Uele), Vankerckhovenville (Ituri) (AMERICAN CONGO EXPEDITION).

WITTE (n° 2, 1933, p. 74, *E. nitida* var. *garambensis*).

Mauda, Dika (Uele) (SCHOUTEDEN).