

## Le genre *Podarcis* Wagler, 1830

— IL NE VIT PAS CHEZ NOUS... —



*Podarcis melisellensis*, le lézard de l'Adriatique, Croatie, 2008.

Les *Podarcis* sont des petits Lacertidae mesurant habituellement entre 5 et 8 cm du museau au cloaque. Ils sont caractérisés par certaines particularités anatomiques : 26 ou 27 vertèbres présacrales chez le mâle, ou fontanelle du sternum cordiforme. Ce sont les seuls Lacertidae chez qui les oviductes s'insèrent dans le sinus génital près du bout des lobes. Le plus souvent, ils ne possèdent qu'une seule écaille post-nasale, et il existe un fort dimorphisme sexuel au niveau de la coloration. Souvent, les femelles sont lignées. Les mâles atteignent de plus grandes tailles. Les *Podarcis* sont répartis en Afrique du Nord, Europe et nord-ouest de la Turquie.

Actuellement, 20 espèces de *Podarcis* sont connues, mais il est possible que ce nombre augmente suite aux résultats d'études en cours et à venir sur la taxinomie du genre.

Comparés aux autres petits Lacertidae sympatriques\*, les *Podarcis* occupent généralement des habitats secs et chauds. Ceci paraît cependant moins évident chez les populations de *Podarcis muralis* vivant en dehors de la région méditerranéenne. L'habitat et les microhabitats\* occupés sont en général de nature minérale (karst, murs de pierre, éboulis, rochers, plages de galets, toitures en tuile...), bien que des populations du groupe de *Podarcis hispanicus*, ou encore *P. siculus*, se rencontrent au sol autour et dans la végétation herbacée. Quelques espèces sont très commensales de l'homme, et n'hésitent pas à habiter dans les structures favorables trouvées dans les bâtisses, jardins et diverses infrastructures (voies de chemin de fer, petites routes, ponts...).

### Références

Arnold (1973, 1989), Arnold *et al.* (2007), Harris & Carretero (2003), Sindaco & Jeremčenko (2008).