

Lacerta bedriagae bedriagae CAMERANO. - Corsica.

Materiale: 18 esemplari di cui: 10 dei passi tra Vivario e Zicavo (oltre 700 m.) (3 maschi, 5 femmine e 2 ju. prov. dalla croc. del « Corinna », racc. e donati dal prof. Giglioli, racc. sotto calcinacci in fessure il 19-21 sett. 1877; vaso n. 204, mag. 311), 2 di Lago d'Argento (Monte Rotondo) (maschi, dono del Dr. Major, catt. il 7 luglio 1880, vaso n. 514, mag. 1628), 3 di Tinozzo (sotto il Monte Rotondo) (2 maschi e 1 femm., dono del Dr. Major e catt. il 6 luglio 1880; vaso n. 515,

mag. 1628); 1 di Pietrapiana (sotto il Monte Cinto) (femm., dono del Dr. Major e racc. il 16 luglio 1880; vaso n. 516, mag. 1628); 1 della Foresta di Tartagina (femm., dono del March. Torrigiani e catt. il 21 aprile 1892; vaso n. 516 bis, mag. 3177), 1 della cima del Monte Cinto (femm., dono del Dr. Major e catt. il 16 luglio 1880; vaso n. 517, mag. 1628).

L'altezza della testa è eguale, di solito, alla distanza tra il centro del timpano e l'angolo posteriore dell'occhio, in tre casi uguale alla distanza tra il centro del timpano ed un punto di mezzo tra l'angolo posteriore dell'occhio ed il centro dell'occhio. Masseterico di solito assente, piccolo unico in tre casi, piccolo doppio in due, grandetto in due, quadruplo evidente in un caso; frontale di solito un poco più corto che la sua distanza dalla fine del muso, in un caso molto più corto, in uno uguale, in due un poco più lungo ed in uno molto più lungo di tale distanza; sopralabiali in sette casi 5 bilateralmente, in sei 5 unilateralmente, in cinque 4 bilateralmente; placca anale grande trapezoide contornata ininterrottamente da una serie di squame. Collo più stretto della massima larghezza della testa. Lunghezza massima del corpo (testa + tronco) mm. 84, di solito 75-80, lunghezza dell'arto posteriore massima mm. 50, del piede posteriore massima mm. 21; coda lunga fino a mm. 148. Scaglie sotto la gola in linea longitudinale da 28 a 38, di solito 34-36; scaglie al collare da 8 a 12, di solito 11-12; scaglie addominali in linea longitudinale da 23 a 27, di solito 24-26; pori femorali d'ambo i lati da 18 a 27, di solito 22-25; scaglie attraverso il corpo dorsalmente in una linea trasversale da 63 a 76, di solito 66-72; scaglie sotto il 4° dito da 25 a 32, di solito 28-29; scaglie al 4° giro di coda dopo i granuli post-anali da 29 a 37, di solito 30-32.

Colorito: tipico.