



PSAMMODROMUS HISPANICUS *Lagartija cenicienta*

Lám. 76

Port.: Sardanisca-iberica.

Identificación. Adultos hasta 5 cm de hocico a cloaca; hasta 15 incluyendo la cola. Pequeña lagartija de aspecto esbelto, morro ligeramente largo y collar presente aunque poco señalado. Escamas dorsales grandes, imbricadas y carenadas. Colorido muy variable, presentando el dorso de color pardo, grisáceo u oliva con manchas o líneas entrecortadas oscuras, blancas o amarillas. Partes inferiores blancuzcas. Los machos en celo suelen presentar en los costados líneas verdosas.

Especies parecidas. *Psammodromus algirus* (sp. anterior).

Hábitat. Especie normalmente de zonas llanas, encontrándose en lugares abiertos con algún matorral, suelos con vegetación herbácea rala o suelos pedregosos. También presente en zonas cultivadas como olivares viejos y zonas más áridas.

Biología. Vive cerca de pequeños matorrales en los que encuentra refugio en caso de peligro, escondiéndose hábilmente entre las raíces y partes más enmarañadas. Al ser capturada emite chillidos fácilmente audibles. Al parecer no construye madriguera y su alimentación es análoga a la de *Psammodromus algirus*. Sin embargo existe una gran diferencia en el tamaño de las presas de estas dos especies, ya que mientras *Ps. hispanicus* restringe su rango a presas como máximo de 2 cm de longitud. *Ps. algirus* captura especies comprendidas entre 0 y 5 cm de longitud. Su biología de reproducción es muy

poco conocida, sabiéndose únicamente que la puesta consta de 3 ó 4 huevos alargados y que se realiza sobre mayo o junio.

Distribución. Falta en el norte de Portugal, Galicia, zona cantábrica, País Vasco y Pirineos. Presente en el resto de la Península. Mapa 43.