

Большое количество вредных насекомых в составе кормов кашгарской ящурки свидетельствует о ее положительном значении в биоценозах.

**ЯЩУРКА АЛАШАНСКАЯ —
EREMIAS (PAREREMIAS) QUADRIFRONS (STRAUCH), 1876**

Терра typica — пустыня Алашань.

- 1876 — *Podarces (Eremias) quadrifrons*, Штраух, Опис. пресм. и земн., собр. экспед. подполк. Пржевальского, в кн.: Пржевальский, Монголия и страна Тангутов: 34.
1887 — *Eremias quadrifrons*, Boulenger, Cat. Liz. Brit. Mus., III:105. — 1912, Бедряга, Научн. результ. путеш. Пржевальского по Ц. Азии, III, I, Земн. и пресм.: 552. — 1921, Boulenger, Monograf. the Lacert., II: 332. — 1935, Pope, Rept. of China, Nat. Hist. of C. Asia, X: 479.

Описание (рис. 10). До сих пор был известен кроме голотипа еще один экземпляр, хранившийся в Базельском музее¹ (Boulenger, 1921).




Рис. 10. Голова ящурки алашанской (*E. quadrifrons*).

Слева направо: сверху, сбоку, снизу.

ger, 1921). Голотип: № 3930, пустыня Алашань, 1870 г., leg. Н. М. Пржевальский, ♂, L — 62,6 мм. Lcd — 77,0 мм. $\frac{L}{Lcd} = 0,81$. G — 36. Sq — 55. Ventr — 30. Lab — 11; нижнегубных щитков 7/8. Подглазничный щиток не касается края рта. Пятый нижнечелюстной не касается нижнегубных. Лобноносовых — один. Длина лобноносового меньше его ширины. Надглазничные щитки не отделены рядом зернышек от лобного и лобнотеменных. Между предлобными дополнительный щиток отсутствует. Длина нижнего края межчелюстного щитка больше длины площадки с зернышками перед первым надглазничным. Вокруг 9—10-го кольца хвоста 28 чешуй. Верхнехвостовые чешуи гладкие. Р. f. — 12/13. Промежуток между рядами бедренных пор укладывается в длине одного ряда 1,3 раза. Ряд бедренных пор довольно далеко не доходит до сгиба колен. В анальной области 9 щитков, 2 из них увеличены. Рисунок:

¹ Уже после окончания настоящей работы благодаря любезности проф. Е. Крамера нами был получен этот экземпляр из Базеля. Его определение показало, что он относится к виду *E. multiocellata*.

основной фон спинной поверхности туловища оливково-серого цвета с рыжевато-бурым налетом, на котором выражены темные прерывающиеся полосы и глазки (рис. 11). Более детально рисунок можно охарактеризовать следующим образом: середина спины свободная от пятен. Затылочные (по-видимому, слитые вместе с хребтовыми) темные полосы местами прерываются и проходят до основания хвоста, где постепенно исчезают. Теменные полосы, сплошные до уровня передних конечностей, затем прерываются и следуют до основания хвоста. Промежуток между затылочной и теменной полосой более светлый, чем основной фон, образует спинную светлую полосу. Височная полоса, сплошная до основания передних лап, затем распадается на ряд светлых глазков, окаймленных темным; ниже по бокам тела имеется еще один ряд глазков, образованных из верхнечелюстной темной полосы. Как было установлено при анализе более свежего материала (Бедряга, 1912), височный ряд глазков внутри белого цвета, верхнечелюстной — внутри голубого. Верхняя поверхность конечностей с белыми или рыжевато-белыми кругловатыми пятнами, частично окаймленными темным. Брюшная сторона белая.

Отличие от близких видов. Из типового местонахождения *E. quadrifrons* — Алашани доставлено усилиями отечественных путешественников большое количество ящурок (около нескольких сот экземпляров), однако представителей данного вида, за исключением голотипа, так и не встречено. Все это настораживает и дает основание для предположения двух возможностей: либо это чрезвычайно редкая аномалия глазчатой ящурки, либо очень редкий вид, локализованный в каком-то узком биотопе (судя по пропорциям туловища и рисунку — в горной местности), который более не посещался натуралистами. Находившийся в нашем распоряжении экземпляр не позволяет решить этот вопрос: некоторые его признаки далеко выходят за пределы изменчивости несомненно близкого к нему вида *E. multiocellata*. Еще далее стоит алашанская ящурка от распространенных здесь других видов. Таким образом, окончательное решение этого вопроса зависит от получения дополнительного материала.

Рисунок и окраска *E. quadrifrons* напоминают некоторые варианты рисунка *E. argus*; ее габитус и фолидоз (за одним исключением) укладываются в границы варьирования *E. multiocellata*. Следовательно, алашанская ящурка отличается от глазчатой рисунком (у последней отсутствуют выраженные затылочно-хребтовые темные полосы и светлые спинные полосы) и значительно более широким межчелюстным щитком (наибольшая ширина межчелюстного щитка у алашанской — больше расстояния между первым верхнересничным и задненосовым щитками, у глазчатой, кашгарской и гобийской — меньше).

Отличия *E. quadrifrons* от ордосской и монгольской ящурок следующие: у последних, как правило, два лобноносовых щитка, у алашанской — только один. Если у монгольской ящурки все же

встречается как редкая аномалия — один лобноносовой (такие особи достоверно известны из-под Кяхты, где, кроме *E. argus*, отсутствуют ящурки других видов), то эти виды легко различить по количеству горловых чешуек: у *E. argus* их не бывает больше 28, у *E. quadrifrons* обнаружено 36. Рассматриваемый вид надежно отличается от распространенной в Алашани *E. vermiculata* рисунком, отсутствием ряда зернышек между надглазничными, с одной стороны, лобным и лобнотемненным — с другой, меньшим количеством брюшных щитков (у *E. vermiculata* минимум 34) и бедренных пор (у *E. vermiculata* минимум 16), а также рядом других признаков.

Распространение. Голотип был добыт Н. М. Пржевальским в пустыне Алашань¹. Если допустить, что редкость этого вида в коллекциях объясняется обитанием в местности, не посещаемой более путешественниками, то таким районом является восточная часть Алашани (севернее Ордоса и южнее хребта Нарин-Ула), включая северную часть Алашанского хребта, которая после экспедиции 1870—1873 гг. была в стороне от маршрутов других экспедиций Н. М. Пржевальского и его последователей.

Экология — не известна.

В желудке единственной ящурки, имеющейся в нашем распоряжении, найдены жуки-чернотелки (Tenebrionodae) — 2 экз. (*Oogaster* sp., *Tentyria* sp.) и жук-пыльцеед (Alleculidae) — 1 экз., а также растительные остатки — 5 цветков Papilionaceae.