

***Darevskia bendimahiensis* (Schmidtler, Eiselt & Darevsky, 1994)**
Bendimahi Kertenkelesi

Tanım: Vücut uzunluğu 19 cm kadardır. Rostrum ve burun deliği arasında temas yoktur. Sırt tarafında kahverengimsi gri üzerinde siyahımsı düzensiz enine desenler bulunur. Gövde yanları siyahımsı-kahverengi bir zemin üzerine yuvarlak ve küçük mavi lekelidir. Karın tarafı beyazımsıdır.

Biyoloji: Suya yakın volkanik kayalar üzerinde güneşlenirler. Böcekler ve diğer bazı omurgasızlar ile beslenirler. Partenogenetik (dölllenme olmaksızın yumurtadan yavru gelişmesi) ürer ve bir dişi 2 kadar yumurta bırakır.

Dağılışı: Ülkemizin doğusuna (Van-Ağrı) endemik olan tür 1800-2300 m yüksekliklerde dağılışı gösterir.

Koruma durumu – IUCN: EN; **BERN:** III; **CITES:** Liste dışı



***Darevskia bendimahiensis* (Schmidtler, Eiselt & Darevsky, 1994)**
Bendimahi Lizard

Identification: Body length up to 19 cm. No contact between rostral and nostril. Dorsum brownish gray with blackish irregular transverse markings on this ground. Small rounded blue spots on blackish-brown ground on the flanks. The venter is whitish.

Biology: Basks on basalt rocks near the water bodies. Feeds on insects as well as some other invertebrates. Reproduction is parthenogenetic and a female lays 2 eggs.

Distribution: Endemic to eastern Türkiye (Van and Ağrı provinces) with a vertical distribution between 1800-2300 m.

Conservation status – IUCN: EN; **BERN:** III; **CITES:** Unlisted

