

Le lézard Ocelle

Lacerta lepida (Daudin, 1802)

Classe : Reptiles

Ordre : Squamates

Famille : Lacertidés



Source originale

Biologie et écologie

Le Lézard ocellé est l'un des plus grands Lacertidés (taille moyenne entre 40 et 60 cm) (Grillet, 2002). Il est endémique d'Afrique du Nord. Il a une tête robuste et une queue dont la taille est le double du reste du corps. Les écailles dorsales sont légèrement carénées. Il est facilement reconnaissable par sa couleur le plus souvent verte et parfois brune. Il présente des ocelles à centre clair ou bleu sur les flancs. Un dimorphisme sexuel portant sur la couleur existe chez cette espèce : les mâles ont une poitrine jaune, verdâtre chez la femelle; la base de la queue est brune sombre chez les mâles, mais de même couleur que le dos chez les femelles (Nouira, 1998). Le Lézard ocellé est principalement insectivore et peut également consommer des fruits.

Il habite les milieux ouverts présentant un couvert végétal souvent broussailleux, les forêts de chênes, les prairies, les milieux rocheux, broussailles près des rigoles d'irrigation, la bordure des oueds, les murs pierreux, etc... (Nouira, 1998), vignes, oliveraies (Le Garff, 1991).

Le Lézard ocellé est ovipare les accouplements ont lieu au printemps (entre avril et juin) et les pontes probablement en juin-juillet (Castilla, 1989 ; Cheylan et Grillet, 2004). Dans la région, on commence à trouver des juvéniles de l'année à partir de début septembre.