


Lacerta hispanica (STEINDACHNER) 1870 Lagartija ibérica.


DESCRIPCION. Especie de pequeño tamaño, con la cabeza y cuerpo muy deprimidos. La cola mide dos veces la longitud de cabeza y cuerpo. La rostral contacta con la cavidad nasal. Gránulos presentes entre las supraoculares y las supraciliares. Regularmente hay cinco supralabiales anteriores a la subocular. De 26 a 29 escamas gulares. Collar formado por 8 a 11 escamas. Escamas dorsales lisas y pequeñas, en número de 50 a 60 en el centro del cuerpo. De 26 a 30 series transversales de ventrales.

De 14 a 19 poros femorales de cada lado y de 25 a 26 lamelas bajo el cuarto dedo. El colorido es extremadamente variable según las localidades. Generalmente las hembras tienen el dorso gris con cinco o siete bandas longitudinales oscuras. Los machos tienen el dorso claro y en los costados presentan una banda pardo oscura o grisácea. En las poblaciones del noroeste, de mayor tamaño y más pigmentadas, el dorso es verde mezclado con pardo y las bandas laterales son más oscuras. Inferiormente son de color blanco sucio con la garganta ligeramente moteada de negro. Los machos en celo presentan el vientre de color rojo ladrillo.

LONGITUD TOTAL. Hasta 160 mm.

BIOLOGIA. Esta pequeña especie vive en los pedregales y troncos de los árboles, mostrando una especial predilección por los muros viejos y tapias de las viviendas. Al igual que la salamancha (*Tarentola mauritanica*), no parece importarles vivir junto al hombre e incluso puede decirse que estas poblaciones, exentas de predadores, son más numerosas y florecientes que las del campo. Poco agresivos, los machos defienden sus pequeños te-





Lagartija ibérica (*Lacerta hispanica*)

territorios con poca pasión frente a los demás y toleran a las hembras jóvenes. En mayo tiene lugar la puesta, poniendo las hembras sólo dos huevos de relativo gran tamaño, pues tienen 12 milímetros de diámetro máximo. El período de incubación dura 63 días, transcurridos los cuales nacen las crías, que, muy vivarachas, miden 51 mm. al nacer y presentan el diseño muy nítido.

DISTRIBUCION. Prácticamente viven en toda la Península. También se encuentran en las Islas Columbretes, situadas en el Mediterráneo, frente a las costas de Castellón.

Lacerta lilfordi (GÜNTHER), 1847. Lagartija balear.